



## Centro Ecográfico de Entrecampos

### Amniocentese

Primeiro é feita uma ecografia para observar o feto, a placenta, a quantidade de líquido, e escolher o melhor local para realizar a amniocentese.

Depois da desinfecção da pele, uma agulha fina é inserida através da parede abdominal materna, sendo a sua progressão cuidadosamente controlada por ecografia, até à cavidade uterina.

Após a aspiração da quantidade necessária (10-15 ml) de líquido para uma seringa, é retirada a agulha.

Este procedimento demora normalmente 2 a 3 minutos.

Por fim, verifica-se se os batimentos cardíacos e a actividade do feto são normais.

### Durante e após a amniocentese. O que posso sentir?

Sentirá uma picada na pele e uma ligeira dor (ou sensação de pressão) quando a agulha chegar ao útero e, também quando for retirada.

Durante 1 a 2 dias poderá sentir um ligeiro desconforto abdominal e perda de pequena quantidade de líquido pela vagina. Isso é relativamente frequente e, na grande maioria dos casos a gravidez continuará sem problemas. Se tiver necessidade, pode tomar paracetamol (Bem-u-ron, Panasorbe, Tylenol...).

É importante reduzir os esforços físicos ao mínimo indispensável, mantendo-se em casa, nas primeiras 48 horas após a amniocentese.

Se a dor for intensa ou persistir, se tiver hemorragia ou perda abundante de líquido pela vagina, ou febre, deve recorrer de imediato a cuidados médicos.

### Amniocentese. Quanto tempo demora o resultado?

Normalmente demora 10 a 12 dias. O resultado será enviado do Laboratório para o Centro Ecográfico. Quando tal acontecer, será informada de imediato pelo telefone.

Numa percentagem inferior a 1 %, pode haver dificuldades de processamento laboratorial (por exemplo: ausência de crescimento celular).

### Amniocentese. Quais são os riscos?

O risco estatístico de aborto é de cerca de 0.5 a 1%, quando a amniocentese é realizada depois das 15 semanas.

O aborto, quando relacionado com o procedimento, acontece nas 2 semanas seguintes à realização da amniocentese, mas com maior frequência na 1ª semana.

### Amniocentese. Em que tempo de gravidez?

Fazemos amniocentese preferencialmente entre as 16 e as 17 semanas.

### Amniocentese. Se o grupo de sangue for Rh negativo?

Deve fazer nas 72 horas seguintes uma injeção intra-muscular de imunoglobulina, para prevenir a imunização Rh. Esta só existe em serviços hospitalares, pelo que iremos solicitar a sua ida a um hospital dentro deste prazo.